

# 新型冠状病毒感染的肺炎 防控手册

中伟新材料股份有限公司

2020年1月30日

本手册根据应急管理部（应急总医院）《新型冠状病毒感染的肺炎防控知识手册》要求，并结合中伟新材料股份有限公司的实际情  
况制定。

# 目 录

一、工作防护.....	5
(一) 工作原则.....	5
1、坚持接受政府统一领导原则 .....	5
2、坚持“统一领导、分级管理”原则.....	5
3、坚持科技引领原则 .....	5
(二) 工作要求.....	5
强化上下班全流程管理 .....	5
1、上班时间如何安排? .....	5
2、上班途中如何做? .....	6
3、入楼工作如何做? .....	6
4、入室办公如何做? .....	6
5、参加会议如何做? .....	6
6、食堂进餐如何做? .....	6
7、下班路上如何做? .....	7
强化公务活动管理.....	7
1、公务出行如何做? .....	7
2、公务来访如何做? .....	7
3、公务采购如何做? .....	7
强化工间活动管理.....	7
1、传阅文件如何做? .....	7
2、工间运动如何做? .....	7
强化后勤服务管理.....	8
1、公共区域消毒如何做? .....	8
2、电话消毒如何做? .....	8
3、空调消毒如何做? .....	8
4、后勤人员如何做? .....	8
5、废弃口罩处理如何做? .....	8
二、个人防护.....	8
(一) 洗手篇.....	8
1、如何保护自己远离新型冠状病毒的肺炎传染? .....	8
2、洗手在预防呼吸道传播疾病中有何作用? .....	9
3、如何正确洗手? .....	9
4、哪些时刻需要洗手? .....	9
5、旅途在外没有清水,不方便洗手,怎么办? .....	10
(二) 口罩篇.....	10
1、口罩该怎么选? .....	10
2、如何正确使用口罩? .....	10
3、特殊人群如何佩戴口罩? .....	11
三、居家防护.....	11
1、在家中怎样预防新型冠状病毒的肺炎传染? .....	11
2、新型冠状病毒感染的肺炎流行时,我们怎么吃才好? .....	11
3、前往公共场所,怎样预防新型冠状病毒的肺炎感染? .....	12
4、到生鲜市场采购,怎样预防新型冠状病毒的肺炎传染? .....	12
5、对轻症发热病例的居家隔离有何建议? .....	12

四、肺炎知识.....	<b>13</b>
(一) 基本概念.....	<b>13</b>
1、什么是新型冠状病毒? .....	13
2、哪些人容易感染新型冠状病毒? .....	13
3、新型冠状病毒的传播途径有哪些? .....	13
4、新型冠状病毒会人传人吗? .....	13
5、什么是“飞沫传播”? .....	13
6、什么是“接触传播”? .....	14
7、什么是“密切接触者”? .....	14
8、新型冠状病毒感染的肺炎患者有什么临床表现? .....	14
9、在临床上, 怎样识别观察新型冠状病毒感染的肺炎病例? .....	14
(二) 防控措施.....	<b>15</b>
1、对密切接触者, 有何注意事项? .....	15
2、对密切接触者, 有何监控建议? .....	15
3、对新型冠状病毒感染的肺炎, 有哪几项防控措施? .....	15
五、就医知识.....	<b>16</b>
1、何时就医? .....	16
2、就医时, 有哪些注意事项? .....	16

## 一、工作防护

### （一）工作原则

#### 1、坚持接受政府统一领导原则

贯彻落实党中央、国务院和各级政府要求，各基地、各中心肺炎疫情防控工作应服从当地政府的统一领导和指挥，严格按照当地政府要求做好各项防控工作。

#### 2、坚持“统一领导、分级管理”原则

公司成立由董事长担任组长的肺炎疫情防控工作领导小组，对全公司肺炎疫情防控工作进行统一领导和统筹管理。公司各中心、各部门负责人为本单位肺炎疫情防控工作第一责任人，在疫情防控小组的统一领导下开展肺炎疫情防控工作，及时履行报告、宣传、隔离、监测、病毒消杀等工作，对本单位新型冠状病毒感染的肺炎防控工作负全责。

#### 3、坚持科技引领原则

全面提升全公司经营管理的线上化、无纸化、数字化、智能化水平，尽量减少人与人之间的接触，减少纸张等物理媒介的传递，降低员工感染新型冠状病毒的概率。

### （二）工作要求

#### 强化上下班全流程管理

#### 1、上班时间如何安排？

各单位要严格按照公司及当地政府要求和指引，妥善做好春节复工安排。对于特殊情况确需加班的，各单位要做好身份甄别、检疫查验和健康防护工作，不能掉以轻心。

在疫情解除前，对于湖北地区的员工，要全面实行远程化办公，所有员工在家实行居家隔离；对于近期前往或途径湖北地区的员工，以及与湖北人员有过密切接触史的员工，要严格落实居家隔离观察 **14** 天的要求，并做好自我监测。重点关注人群排除疫情感染可能性后，若要进入公司厂区办公需提交书面申请。

## 2、上班途中如何做？

正确佩戴一次性医用口罩。尽量不乘坐公共交通工具，建议步行、骑行或乘坐私家车、班车上班。如必须乘坐公共交通工具时，务必全程佩戴口罩。途中尽量避免用手触摸车上物品。

## 3、进入厂区工作如何做？

进入厂区前自觉接受体温检测，体温正常可进入厂区工作，并到卫生间洗手。若体温超过 **37.2℃**，请勿进入厂区，并回家观察休息，必要时到医院就诊。进入厂区所有人必须全时段佩戴口罩，不得在任何区域（办公室、车间、食堂、园区等）取下口罩。

## 4、入室办公如何做？

保持办公区环境清洁，建议各职场每日通风 **3** 次，每次 **20-30** 分钟，通风时注意保暖。人与人之间保持 **1** 米以上距离，多人办公时佩戴口罩。保持勤洗手、多饮水，坚持在进食前、如厕后按照六步法严格洗手。接待外来人员双方佩戴口罩。各车间、各宿舍、各办公室区间要保持独立性，无特殊情况严禁相互走动。

## 5、参加会议如何做？

近期原则上不集中开会，要充分利用视频会议系统等工具，提高远程会议、线上会议召开比例，尽量减少人与人之间近距离接触的机会。若有紧急事项需要召集多人在同一空间举行会议，需上报应急管理小组批准，尽量控制人数，降低开会人员密度。

建议佩戴口罩，进入会议室前洗手消毒。开会人员间隔 **1** 米以上。减少集中开会，控制会议时间，会议时间过长时，开窗通风 **1** 次。会议结束后，各单位要对场地、家具进行消毒。茶具用品要用开水浸泡消毒。

近期各部门所有年会、培训、团建等聚集性活动或重大集会一律取消。

## 6、食堂进餐如何做？

各单位要采用分餐进食，避免人员密集，车间用餐一律统一配送至各车间。餐厅每日消毒 **1** 次，餐桌椅使用后进行消毒。餐具用品须高温消毒。操作间保持清洁干燥，严禁生食和熟食品混用，避免肉类生食。

## 7、下班路上如何做？

洗手后，佩戴一次性医用口罩外出；回到家中摘掉口罩后，首先洗手消毒。手机和钥匙使用消毒湿巾或 75%酒精擦拭。居室保持通风和卫生清洁，避免多人聚会。

### 强化公务活动管理

#### 1、公务出行如何做？

专车内部及门把手建议每日用 75%酒精擦拭 1 次。乘坐班车须佩戴口罩，班车在使用后用 75%酒精对车内及门把手擦拭消毒。

#### 2、公务来访如何做？

须佩戴口罩。进入厂区前首先进行体温检测，并介绍有无湖北接触史和发热、咳嗽、呼吸不畅等症状。无上述情况，且体温在 37.2°正常条件下，方可进入厂区公干。所有进入到公司的外来人员，一定要做到详细的信息登记，做到可追溯。

#### 3、公务采购如何做？

须佩戴口罩出行，避开密集人群。与人接触保持 1 米以上距离，避免在公共场所长时间停留。

### 强化工间活动管理

#### 1、传阅文件如何做？

目前，公司已通过 OA 系统等，全面实现了日常办公的线上化、无纸化、数字化运行，基本可以消除物理纸张的运用。各单位要切实落实无纸化办公要求，尽量避免物理纸张的使用和传递。

如因特殊原因（如外部文件盖章等）确需进行纸质文件传递的，传递纸质文件前后均需洗手，传阅文件时佩戴口罩。

#### 2、工间运动如何做？

建议适当、适度活动，保证身体状况良好。避免过度、过量运动，造成身体免疫能力下降。

## 强化后勤服务管理

### 1、公共区域消毒如何做？

每日须对门厅、楼道、会议室、电梯、楼梯、卫生间、办公区域、食堂、班车等公共区域进行消毒，尽量使用喷雾消毒。每个区域使用的保洁用具要分开，避免混用。

### 2、电话消毒如何做？

建议座机电话每日 75%酒精擦拭两次，如果使用频繁可增加至四次。

### 3、空调消毒如何做？

(1) 中央空调系统风机盘管正常使用时，定期对送风口、回风口进行消毒；

(2) 中央空调新风系统正常使用时，若出现疫情，不要停止风机运行，应在人员撤离后，对排风支管封闭，运行一段时间后关断新风排风系统，同时进行消毒；

(3) 带回风的全空气系统，应把回风完全封闭，保证系统全新风运行。

### 4、后勤人员如何做？

服务人员、安保人员、清洁人员工作时须佩戴口罩，并与人保持安全距离。食堂采购人员或供货人员须佩戴口罩和一次性橡胶手套，避免直接手触肉禽类生鲜材料，摘手套后及时洗手消毒。保洁人员工作时须佩戴一次性橡胶手套，工作结束后洗手消毒。安保人员须佩戴口罩工作，并认真询问和登记外来人员状况，发现异常情况及时报告。

### 5、废弃口罩处理如何做？

防疫期间，摘口罩前后做好手卫生，废弃口罩放入垃圾桶内，每天两次使用 75%酒精或含氯消毒剂对垃圾桶进行消毒处理。

## 二、个人防护

### (一) 洗手篇

#### 1、如何保护自己远离新型冠状病毒的肺炎传染？

(1) 勤洗手。使用肥皂或洗手液并用流动水洗手，用一次性纸巾或干净毛



巾擦手。双手接触呼吸道分泌物后（如打喷嚏后）应立即洗手；

（2）保持良好的呼吸道卫生习惯。咳嗽或打喷嚏时，用纸巾、毛巾等遮住口鼻，咳嗽或打喷嚏后洗手，避免用手触摸眼睛、鼻或口；

（3）增强体质和免疫力。均衡饮食、适量运动、作息规律，避免产生过度疲劳；

（4）保持环境清洁和通风。每天开窗通风数次不少于3次，每次20-30分钟。户外空气质量较差时，通风换气频次和时间应适当减少；

（5）尽量减少到人群密集场所活动，避免接触呼吸道感染患者；

（6）如出现呼吸道感染症状如咳嗽、流涕、发热等，应居家隔离休息，持续发热不退或症状加重时及早就医。

## 2、洗手在预防呼吸道传播疾病中有何作用？

正确洗手是预防腹泻和呼吸道感染的最有效措施之一。国家疾病预防控制中心、WHO及美国CDC等权威机构均推荐用肥皂和清水（流水）充分洗手。

## 3、如何正确洗手？

需掌握六步洗手法：

第一步，双手手心相互搓洗（双手合十搓五下）；

第二步，双手交叉搓洗手指缝（手心对手背，双手交叉相叠，左右手交换各搓洗五下）；

第三步，手心对手心搓洗手指缝（手心相对十指交错，搓洗五下）；

第四步，指尖搓洗手心，左右手相同（指尖放于手心相互搓洗搓五下）；

第五步，一只手握住另一只手的拇指搓洗，左右手相同搓五下；

第六步，弯曲手指使关节在另一手掌心旋转揉搓，交换进行各搓五下。

## 4、哪些时刻需要洗手？

（1）传递文件前后；

（2）在咳嗽或打喷嚏后；

- (3) 在制备食品之前、期间和之后；
- (4) 吃饭前；
- (5) 上厕所后；
- (6) 手脏时；
- (7) 在接触他人后；
- (8) 接触过动物之后；
- (9) 外出回来后。

## 5、旅途在外没有清水，不方便洗手，怎么办？

可以使用含酒精消毒产品清洁双手。人冠状病毒不耐酸不耐碱，并且对有机溶剂和消毒剂敏感。75%酒精可灭活病毒，所以达到一定浓度的含酒精消毒产品可以作为肥皂和流水洗手的替代方案。

### (二) 口罩篇

#### 1、口罩该怎么选？

选择一：一次性医用口罩，连续佩戴4小时更换，污染或潮湿后立即更换；

选择二：N95医用防护口罩，连续佩戴4小时更换，污染或潮湿后立即更换。

棉布口罩、海绵口罩均不推荐。

#### 2、如何正确使用口罩？

医用口罩的使用方法：

(1) 口罩颜色深的是正面，正面应该朝外，且医用口罩上还有鼻夹金属条；

(2) 正对脸部的应该是医用口罩的反面，也就是颜色比较浅的一面，除此之外，要注意带有金属条的部分应该在口罩的上方，不要戴反了；

(3) 分清楚口罩的正面、反面、上端、下端后，先将手洗干净，确定口罩是否正确之后，将两端的绳子挂在耳朵上；

(4) 最后一步，也是前面提到过的金属条问题，将口罩佩戴完毕后，需要用双手压紧鼻梁两侧的金属条，使口罩上端紧贴鼻梁，然后向下拉伸口罩，使

口罩不留有褶皱，最好覆盖住鼻子和嘴巴。

### 3、特殊人群如何佩戴口罩？

- (1) 孕妇佩戴口罩，应注意结合自身条件，选择舒适性比较好的产品；
- (2) 老年人及有心肺疾病慢性病患者佩戴后会造成不适感，甚至会加重原有病情，应寻求医生的专业指导；
- (3) 儿童处在生长发育阶段，其脸型小，选择儿童防护口罩。

## 三、居家防护

### 1、在家中怎样预防新型冠状病毒的肺炎传染？

- (1) 增强卫生健康意识，适量运动、保障睡眠、不熬夜可提高自身免疫力；
- (2) 保持良好的个人卫生习惯，咳嗽或打喷嚏时用纸巾掩住口鼻，经常彻底洗手，不用脏手触摸眼睛、鼻或口；
- (3) 居室多通风换气并保持整洁卫生；
- (4) 尽可能避免与有呼吸道疾病症状（如发热、咳嗽或打喷嚏等）的人密切接触；
- (5) 尽量避免到人多拥挤和空间密闭的场所，如必须去佩戴口罩；
- (6) 避免接触野生动物和家禽家畜；
- (7) 坚持安全的饮食习惯，食用肉类和蛋类要煮熟、煮透；
- (8) 密切关注发热、咳嗽等症状，出现此类症状一定要及时就近就医。

### 2、新型冠状病毒感染的肺炎流行时，我们怎么吃才好？

- (1) 不要食用已经患病的动物及其制品；要从正规渠道购买冰鲜禽肉，食用禽肉、蛋奶时要充分煮熟；
- (2) 处理生食和熟食的切菜板及刀具要分开。处理生食和熟食之间要洗手；
- (3) 即使在发生疫情的地区，如果肉食在食品制备过程中予以彻底烹饪和妥善处理，也可安全食用。

### 3、前往公共场所，怎样预防新型冠状病毒的肺炎感染？

(1) 避免在未加防护的情况下与农场牲畜或野生动物接触。

(2) 保持工作场所室内不断的通风换气；在人多的地方，商场、公交车、地铁和飞机等地方都是人流密集，可佩戴口罩减少接触病原风险。

(3) 咳嗽打喷嚏时，用纸巾或袖或屈肘将鼻完全遮住；将用过的纸巾立刻扔进封闭式垃圾箱内；咳嗽打喷嚏后，用肥皂和清水或含酒精洗手液清洗双手。

(4) 外出回家后及时洗手，如有发热和其他呼吸道感染症状，特别是持续发热不退，及时到医院就诊。

(5) 传染病流行季节应尽量避免各类聚会。

### 4、到生鲜市场采购，怎样预防新型冠状病毒的肺炎传染？

(1) 接触动物和动物产品后，用肥皂和清水洗手；

(2) 避免触摸眼、鼻、口；

(3) 避免与生病的动物和病变的肉接触；

(4) 避免与市场里的流浪动物、垃圾废水接触。

### 5、对轻症发热病例的居家隔离有何建议？

轻症发热病例的居家隔离建议：

(1) 将病人安置在通风良好的单人房间；

(2) 限制看护人数，尽量安排一位健康状况良好且没有慢性疾病的人进行护理。拒绝一切探访；

(3) 家庭成员应住在不同房间，如条件不允许，和病人至少保持 1 米距离；

(4) 限制病人活动，病人和家庭成员活动共享区域最小化。确保共享区域（厨房、浴室等）通风良好（开窗）；

(5) 看护人员与病人共处一室应带好口罩，口罩紧贴面部，佩戴过程禁止触碰和调整。口罩因分泌物变湿、变脏，必须立即更换。摘下及丢弃口罩之后，进行双手清洗；

(6) 与病人有任何直接接触或进入病人隔离空间后，进行双手清洁。

## 四、肺炎知识

### (一) 基本概念

#### 1、什么是新型冠状病毒？

从武汉市不明原因肺炎患者下呼吸道分离出的冠状病毒为一种新型冠状病毒，WHO 命名 2019-nCoV。

#### 2、哪些人容易感染新型冠状病毒？

人群普遍易感。新型冠状病毒感染的肺炎在免疫功能低下和免疫功能正常人群均可发生，与接触病毒的量有一定关系。对于免疫功能较差的人群，例如老年人、孕产妇或存在肝肾功能异常，有慢性病人群，感染后病情更重。

#### 3、新型冠状病毒的传播途径有哪些？

主要传播方式是经飞沫传播、接触传播（包括手污染导致的自我接种）以及不同大小的呼吸道气溶胶近距离传播。目前近距离飞沫传播应该是主要途径。

#### 4、新型冠状病毒会人传人吗？

会。从一些聚集性病例的发病关联次序判断，人传人的特征十分明显，且存在一定范围的社区传播。

#### 5、什么是“飞沫传播”？

飞沫：一般认为直径 $>5\mu\text{m}$ 的含水颗粒，飞沫可以通过一定的距离（一般为1米）进入易感的粘膜表面。

飞沫的产生：

(1) 咳嗽、打喷嚏或说话；

(2) 实施呼吸道侵入性操作，如：吸痰或气管插管、翻身、拍背等刺激咳嗽的过程中和心肺复苏等。

## 6、什么是“接触传播”？

直接接触：病原体通过粘膜或皮肤的直接接触传播。

- (1) 血液或带血体液经粘膜或破损的皮肤进入人体；
- (2) 直接接触含某种病原体的分泌物引起传播。

## 7、什么是“密切接触者”？

指 14 天内曾与病毒的确诊或高度疑似病例有过共同生活或工作的人。

包括办公室的同事，同一教室、宿舍的同事、同学，同机的乘客等。以及其它形式的直接接触者包括病毒感染病人的陪护、乘出租车、乘电梯等。

## 8、新型冠状病毒感染的肺炎患者有什么临床表现？

新型冠状病毒感染的肺炎起病以发热为主要表现，可合并轻度干咳、乏力、呼吸不畅、腹泻等症状，流涕、咳痰等症状少见。部分患者起病症状轻微，可无发热，仅表现为头痛、心慌、胸闷、结膜炎、轻度四肢或腰背部肌肉酸痛。部分患者在一周后出现呼吸困难，严重者病情进展迅速。多数患者预后良好，少数患者病情危重，甚至死亡。

## 9、在临床上，怎样识别观察新型冠状病毒感染的肺炎病例？

同时符合以下 2 个条件：

(1) 流行病学史：在发病前两周内有武汉市旅行或居住史，或发病前 14 天接触过来自武汉的发热伴有呼吸道症状的患者，居住区传染病流行情况，是否为聚集性病例中的患者，是否造成他人感染等。武汉市相关市场，特别是农贸市场直接或间接接触史。

(2) 临床表现：发热；具有病毒性肺炎影像学特征；发病早期白细胞总数正常或降低，或淋巴细胞计数减少。

在观察病例的基础上，采集痰液、咽拭子等呼吸道标本进行病毒核酸检测即可作出病原学诊断。

## （二）防控措施

### 1、对密切接触者，有何注意事项？

对密切接触者的注意事项：

所有跟疑似感染病人可能有接触的人（包括医护人员）都应该有 14 天的健康观察期。观察期从和病人接触的最后一天算起。一旦出现任何症状，特别是发热、呼吸道症状如咳嗽、呼吸短促或腹泻，马上就医！

### 2、对密切接触者，有何监控建议？

对密切接触者的监控建议：

（1）如果接触者出现症状，要提前通知医院，将前往医院；

（2）前往医院的路上，病人应该佩戴医用口罩；

（3）避免搭乘公共交通，应该呼叫救护车或者使用私人车辆运送病人，如果可以，路上打开车窗；

（4）生病的密切接触者应时刻保持呼吸道卫生和进行双手清洁。在路上和医院站着或坐着时，尽可能远离其他人（至少 1 米）；

（5）任何被呼吸道分泌物或体液污染的物体表面都应该用含有稀释漂白剂的消毒剂清洁、消毒。

### 3、对新型冠状病毒感染的肺炎，有哪几项防控措施？

新型冠状病毒感染的肺炎防控措施：

•标准预防措施；

•空气传播预防措施；

•接触和飞沫预防措施：勤洗手，出门戴口罩；

•房间通风换气；

•清洁、消毒：新型冠状病毒对热敏感，56℃热水浸泡 30 分钟、75%酒精、含氯消毒剂，氯仿等脂溶剂均可有效灭活病毒。

## 五、就医知识

### 1、何时就医？

新型冠状病毒感染的肺炎患者主要临床表现为发热、乏力，呼吸道症状以干咳为主，并逐渐出现呼吸困难，严重者表现为急性呼吸窘迫综合征、脓毒症休克、难以纠正的代谢性酸中毒和出凝血功能障碍。部分患者起病症状轻微，可无发热。多数患者为中轻症，预后良好，少数患者病情危重，甚至死亡。如出现发热、乏力、干咳表现，并不意味着已经被感染了。

但如果出现（1）发热（腋下体温 $\geq 37.3^{\circ}\text{C}$ ）、咳嗽、气促等急性呼吸道感染症状；（2）且有武汉旅行或居住史，或发病前14天内曾接触过来自武汉的发热伴呼吸道症状的患者，或出现小范围聚集性发病；应到当地指定医疗机构进行排查、诊治。

### 2、就医时，有哪些注意事项？

- （1）如果接触者出现症状，要提前选择有发热门诊的定点医院；
- （2）前往医院的路上，及就医全程应该佩戴口罩；
- （3）避免搭乘公共交通，应该呼叫救护车或者使用私人车辆运送病人，如果可以，路上打开车窗；
- （4）生病的密切接触者应时刻保持呼吸道卫生和进行双手清洁。在路上和医院站着或坐着时，尽可能远离其他人（至少1米）；
- （5）任何被呼吸道分泌物或体液污染的物体表面都应该用含有稀释漂白剂的消毒剂清洁、消毒；
- （6）就医时，应如实详细讲述患病情况和就医过程，尤其是应告知医生近期的武汉旅行和居住史、肺炎患者或疑似患者的接触史、动物接触史等。